

MOLUSCOS: Especies comestibles de interés comercial

DEFINICIÓN MOLUSCOS	
Metazoos de cuerpo blando, no segmentado y con simetría bilateral enmascarada a veces por una torsión.	
CLASES	1.- GASTERÓPODOS 2.- LAMELIBRANQUIOS 3.- CEFALÓPODOS

1.- GASTERÓPODOS.	
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">- pié ventral que le sirve para la locomoción.- concha univalva y enrollada en espiral cerrándose en algunas especies en su abertura por una placa córnea o caliza denominada opérculo.- hay especies que carecen de concha y de interés bromatológico.- su lengua es córnea, con una serie de dientecillos que se denominan rádula.- en la cabeza tienen tentáculos sensoriales y retráctiles en cuyo extremo suelen situarse los ojos.
A.- PROSOBRANQUIOS.	
HALIOTIDOS	OREJA DE MAR. <i>Haliotis tuberculata</i> .
	PATELAS, LAPAS. <i>Patella vulgata</i> .
LITORÍNIDOS	BÍGAROS. <i>Littorina littorea</i> .
MURÍCIDOS	CAÑADILLAS. <i>Murex brandaris</i> .
B.- PULMONADOS.	
HELÍCIDOS	CARACOL COMÚN. <i>Helix aspersa</i> .
	CARACOL DE MONTE. <i>Helix alonensis</i> .
	CARACOL MORO. <i>Helix lactea</i> .

2.- LAMELIBRANQUIOS.

CARACTERÍSTICAS

- pelecípodos (pié en forma de hacha).
- bivalvos (valvas articuladas por una charnela).
- branquias laminadas y acéfalos.

2.1.- MONOMIARIOS: una sola inserción muscular en la cara interna de la valva.

OSTREIDOS OSTRA COMÚN. *Ostrea edulis*.
OSTRA PORTUGUESA. *Crassostrea angulata*.

PECTÍNIDOS: conchas auriculadas

A.- *Pecten*: valva izquierda plana.
CONCHA DE PEREGRINO. *Pecten jacobaeus*.
VIEIRA. *Pecten maximus*.

b.- *Chlamys*: ambas valvas convexas.

ZAMBURIÑA. *Chlamys varia*.
VOLANDEIRAS. *Chlamys opercularis*.

2.2.- HETEROMIARIOS: Dos inserciones musculares diferentes.

MITÍLIDOS: concha puntiaguda en la extremidad anterior, redondeada en la posterior.

MITILOS MEJILLÓN. *Mytilus edulis*.
MODIOLAS MODIOLA. *Modiola barbata*.
LITODOMOS DÁTIL DE MAR. *Lithodomus lithophagus*.

2.3.- HOMOMIARIOS: dos inserciones musculares iguales.

A.-INTERGRIPALEALES: impresión palear regularmente convexa entre las dos inserciones musculares.

CÁRDIDOS BERBERECHO. *Cardium edule*.
GURRIATO. *Cardium paucicostatum*.

B.- SINUPALEALES: seno profundo palear entre las dos inserciones musculares.

VENÉRIDOS ALMEJA FINA. *Venerupis (Tapes) decussatus*.
ALMEJA BABOSA. *Venerupis (Tapes) pullastra*.
ALMEJA RUBIA. *Venerupis (Tapes) rhomboides*.
ESCUPIÑA. *Venus verrucosa*.
CHIRLA. *Venus gallina*.
MARGARITA. *Tapes aureus*.

DONÁCIDOS COQUINA. *Donax trunculus*.

SOLÉNIDOS MUERGO. *Solen vagina*.
NAVAJA. *Ensis siliqua*.
LONGUEIRÓN. *Solen marginatus*.

3.- CEFALÓPODOS.

CARACTERÍSTICAS

- tentáculos provistos de ventosas prensiles.
- boca en forma de pico de loro.
- algunas especies están provistas de bolsa de tinta.

3.1.- OCTÓPODOS

PULPO. *Octopus vulgaris*.
PULPO BLANCO. *Eledone eldovandi*.
PULPO DE ALTURA. *Eledone cirrosa*.

3.2.- DECÁPODOS

SEPIA. *Sepia officinalis*.
CHOCO. *Sepia orbignyana ferusac*.
CHOQUITO. *Sepia elegans*.
VOLADOR. *Illex illecebrosus coindetti*.
CALAMAR. *Loligo vulgaris*.